



الجمهورية العربية السورية

وزارة الصحة

مديرية الرعاية الصحية الأولية

الرقم ١٤١٩٤

إلى مديرية الخدمات المشتركة

دائرة تقانة المعلومات

تحية طيبة:

إشارة الى نشاطات مديرية الرعاية الصحية الأولية ، برنامج التلقيح الوطني الموسع وإلى حملة تعزيز التلقيح الوطني ومتابعة المتسربين والتي ستفند ١٥-١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ م ، نبين لكم أهم الرسائل التي نرجو نشرها على موقع وزارة الصحة هي التالي:

موعد الحملة: ١٥-١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ م في جميع المراكز الصحية والفرق الجوالة.

اللقاح المستخدم : لقاحات جدول برنامج التلقيح الوطني

الفئة المستهدفة : الأطفال دون الخمس سنوات لتحري الحالة التلقيحية وتزويدهم باللقاحات المستحقة لهم

يتم تقديم خدمة اللقاح : بالمراكز الصحية والفرق الجوالة (يوجد معهم مهمات من مديريات الصحة).

الحالات التالية لاتمنع اللقاح :

١. ارتفاع درجة الحرارة البسيط.

٢. الإسهال.

٣. السعال والرشح.

٤. اليرقان الفيزيولوجي.

٥. استعمال الصادات الحيوية.

الحالات التالية تمنع اللقاح :

١. - ارتفاع الحرارة أكثر أو يساوي ٣٨.٥م.

٢. - المصاب بمرض منهك يستدعي دخوله المشفى .

٣. - تحسس لجرعة لقاح سابقة (تشكل مانعاً للقاح نفسه).

٤. - المصاب بمرض منقوص للمناعة (الإيدز - نقص المناعة الخلقي.....)

٦ - المعالج بأدوية مثبتة للمناعة.

٦. المعالج بأدوية منقصة للمناعة مثل الكورتيكوزون (يعطى اللقاح بعد ٣٠ يوم من إيقاف المعالجة).

مع العلم أن الطفل المعالج بحقنة واحدة من الكورتيكوزون غير المديد أو المعالج لمدة أقل من ١٥ يوماً لا يعتبر مانعاً للقاح .

رسائل الحملة :

١. ضرورة مراجعة الأهالي المراكز الصحية والفرق الجوالة بتاريخ ١٥-١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م في جميع المراكز الصحية والفرق الجوالة.
٢. مصطحبين أطفالهم دون الخمس سنوات لتحري الحالة التلقيحية وإعطائهم اللقاحات المستحقة.
٣. اللقاح آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية.
٤. عدم استكمال اللقاح = عدم التلقيح
٥. التلقيح أمر ضروري وكل طفل يحتاج إلى عدد من جرعات اللقاح خلال العام والنصف الأول من حياته وإلى جرعات إضافية داعمة بعد ذلك.
٦. التلقيح أمر ضروري خاصة خلال العامين الأول والثاني من عمر الطفل لأنه يعزز مناعة الأطفال ضد الأمراض، والوقاية المبكرة خير من العلاج.
٧. إن التلقيح يحمي الطفل من عدة أمراض خطيرة. والطفل الذي لم يلقح ضد المرض أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته وأحياناً .
٨. اللقاحات توفر الحماية للأطفال والمجتمع وإن التهاون في إعطاء اللقاح للأطفال يضر بصحة الطفل والمجتمع.
٩. الوقاية من الأمراض المشمولة باللقاح ممكنة وسهلة عن طريق اللقاح
١٠. جميع فرق التلقيح مزودة بمهمات رسمية.
١١. جميع فرق التلقيح ترتدي لباساً موحداً.
١٢. جميع العناصر المشاركة بالحملة مؤهلة ومدربة.
١٣. لا نطلب من الأهل أية وثيقة، وفي حال عدم تواجد بطاقة اللقاح سيتم تزويد الطفل ببطاقة جديدة

خاصة في ظل انتشار وباء كورونا:

١. الحرص على التباعد المكاني وتجنب الازدحام بين المراجعين.
 ٢. تنظيم الدور بتأمين مسافة أمان بين المراجعين بمقدار (متر ونصف) إن أمكن .
 ٣. الحرص على الالتزام بوسائل الحماية الشخصية للعناصر الصحية العاملة في الحملة
 ٤. الحفاظ على عقامة المراكز الصحية وأيدي العناصر الصحية .
 ٥. لقاح الكوفيد متوفر وآمن ومجاني مع ضرورة تلقي اللقاح للفئات ذات الأولوية : كبار السن ، المصابين بأمراض مزمنة، الكادر الصحي ، الحوامل والمصابين بأمراض منقصة للمناعة.
- هدف الأطفال دون الخمس سنوات الذي ينبغي تحري الحالة التقيحية لهم : ٢٨٠٢١٦٢ طفل دون الخامسة من العمر.

من المتوقع أن يكون ١٣١١٩٧ طفل متسرب عن لقاحه الروتيني وذلك حسب السجلات من المراكز الصحية.

• وعدد المراكز الصحية العاملة ٩٨١ مركز ثابت

• ٢٦٤ مركز محدث

• ٦١٣ فريق جوال

بعدد يصل الى ٩٥٤٩ عنصر صحي عامل خلال الحملة.

سيتم ارسال اليوسر بالايمل

شاكرين تعاونكم

دمشق في ٢٦/٩/٢٠٢٣م

مدير الرعاية الصحية الأولية

د. رزان الطرابيشي

رسائل حملة متابعة المتسربين ١٥-١٩ تشرين الأول ٢٠٢٣

الرسائل الواجب إيصالها للجمهور عن الحملة:

✓ توقيت الحملة: ١٥-١٩/١٠/٢٠٢٣

✓ اللقاح المستخدم: كافة اللقاحات الروتينية في جدول التلقيح الوطني

✓ الفئة المستهدفة: الأطفال دون خمس سنوات المتسربين جزئياً أو كلياً

- المتسرب الكلي: هو الطفل الذي لم يتلق أية جرعة لقاح
- المتسرب الجزئي: هو الطفل الذي تلقى جرعة أو أكثر من اللقاح ولم يستكمل لقاحاته المستحقة

حسب برنامج التلقيح الوطني

• ويمكن أيضاً إعطاء اللقاحات للأطفال المتسربين بأعمار من ٥-١٢ سنة

✓ يتم تقديم خدمة اللقاح: بالمراكز الصحية والفرق الجوالة (يوجد معهم مهمات من مديريات الصحة) والنقاط المحدثة.

الرسائل الواجب إيصالها للجمهور عن الأمراض المشمولة باللقاح:

١- شلل الأطفال:

- ✓ من الأمراض المعدية التي نصيب الجهاز العصبي للإنسان
- ✓ ينتقل المرض من براز الشخص المصاب إلى الآخرين عن طريق الأيدي والأطعمة والمشروبات الملوثة بفيروس شلل الأطفال
- ✓ أعراض المرض الأولية في الحمى والتعب والصداع وتصلب الرقبة والشعور بالآلام في الأطراف
- ✓ يصيب هذا المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى.
- ✓ لقاح الشلل الفموي يحمي الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.
- ✓ الطريقة الوحيدة للوقاية من الإصابة بشلل الأطفال هي تلقي اللقاح وهي ممكنة ومتاحة للجميع.

٢- الحصبة:

- ✓ مرض شديد العدوى، سببه فيروسي، وهو ينتشر عبر القطرات التنفسية عندما يقوم الشخص المصاب بالسعال أو العطاس، أو التماس المباشر مع مفرزات المريض
- ✓ يتظاهر بحمى شديدة، سيلان الأنف وسعال واحمرار في العينين ثم يظهر بعد عدة أيام طفح يبدأ عادة في الوجه وأعلى العنق وينزل إلى أسفل الجسم

✓ **اختلالات الحصبة:** ذات الرئة الفيروسيّة والجراثومية، الإسهال، التهاب الأذن الوسطى، التهاب دماغ وأذية عينية. وقد تسبب الحصبة إعاقة مدى الحياة: أذية دماغية، الصمم، العمى وأحياناً الوفاة

✓ الحصبة الألمانية:

- تتظاهر بحمى مع طفح حطاطي من يوم إلى ثلاثة أيام وتتميز بضخامة عقد لمفية قذالية وخلف الأذن وأعراض مفصلية
- تسبب العدوى قبل الحمل وأثناء الثلث الأول للحمل إجهاضاً للجنين أو الوفاة أو العيوب الخلقية متعددة الأعضاء لدى الجنين تعرف متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية CRS

✓ ٣- الكزاز:

- ✓ مرض حاد يسبب انسهماً في الجملة العصبية المركزية عن طريق دخول أبواغ الكزاز إلى الجسم عبر الجروح الملوثة بمواد تحوي تلك الأبواغ، مثل: الأتربة والغبار والخيوط الجراحية الملوثة
- ✓ معدل الوفاة يتراوح بين 30-90%
- ✓ كزاز الوليد: تظهر الأعراض عند وليد يبدو سويّاً في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، ثم تظهر لديه صعوبة في البلع ورفض للرضاعة يليه عجز عنها بسبب الضرز (تشنج العضلات الماضغة) يترقى المرض إلى تيبس عام مع تشنجات أو اختلاجات وقوس تشنجي (تقوس الظهر بسبب التشنج العضلي الشديد).

✓ ٤- الدفتريا:

- ✓ مرض جرثومي حاد. يتظاهر بسيلان أنفي، حمى، ألم بلعوم، وهن عام، وتظهر الآفة المميزة كطخة أو عدة لطخات من غشاء رمادي ملتصق محاط بالتهاب
- ✓ يمكن أن تؤدي لحدوث عسرة تنفس و زرقة و وفاة
- ✓ قد تسبب اعتلال عضلة قلبية وإصابة عصبية وكلوية

✓ ٥- النكاف:

- ✓ مرض فيروسي حاد ، يتصف بحمى وتورم وألم في الغدد اللعابية
- ✓ قد يسبب التهاب سحايا، التهاب الخصية، التهاب مبيض ويمكن أن يسبب النكاف التهاب الدماغ وأحياناً الصمم

✓ ٦- السعال الديكي (الشاهوق):

- ✓ تميز بنوبات سعال عنيفة متكررة وقد يعقبها شهقة ذات نغمة عالية وكثيراً ما تنتهي نوب السعال بإخراج مخاط رائق ومتماسك.
- ✓ يمكن أن يسبب ذات قصبات ورنّة وخاصة عند الرضع، وقد يسبب التهاب الدماغ

٦- الأمراض التي تسببها المستدمية النزلية ب hib

✓ المستدمية النزلية نوع ب hib هي نوع من البكتيريا المسؤولة تقريباً عن التهاب سحايا، ذات رئة، إنتان دم، التهاب الأذن الوسطى، التهاب مفصل قيجي، و التهاب لسان المزمار في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

الرسائل الواجب إيصالها للجمهور عن اللقاحات:

✓ التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض المشمولة باللقاح (شلل الأطفال، الحصبة والحصبة الألمانية، الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، التهاب الكبد البائي والنكاف)

✓ قد تسبب الإصابة بالأمراض السابقة مرضاً شديداً أو إعاقة وعقاييل مدى الحياة وحتى الوفاة

✓ اللقاح المستخدم معتمد من وزارة الصحة كما أنه معتمد من قبل المنظمات الدولية

✓ اللقاح آمن وفعال ومجاني

✓ قد تحدث بعض التأثيرات الجانبية التالية لإعطاء اللقاح (الحمى الخفيفة، الألم، التورم بموقع الحقن وتهيج الطفل) وهي خفيفة وعابرة وسرعان ما تختفي

✓ أحضر الطفل إلى المركز الصحي في حال استمرار التأثير الجانبي لأكثر من يوم أو يومين أو في حال إصابته بمرض شديد

✓ اللقاح يوفر الحماية للأطفال والمجتمع وإن التهاون في إعطاء اللقاح للأطفال يضر بصحة الطفل والمجتمع

✓ حصول أطفالك على التلقيح يكفل لك ولأسرتك حماية ضد فاشيات الأمراض المشمولة باللقاح إذا اندلعت في بلدك أو أثناء السفر

✓ حرصاً منا على صحة الأطفال وإعطائهم اللقاحات في المواعيد المحددة يرجى الاحتفاظ ببطاقات التلقيح الخاصة بهم

✓ يرجى إحضار بطاقات اللقاح إن وجدت وفي حال عدم توفرها سيتم تزويدهم ببطاقة جديدة

✓ ضرورة استكمال جرعات لقاحات الأطفال كافة، لأن عدم الاستكمال = عدم التلقيح

✓ جميع فرق التلقيح مزودة بمهمات رسمية

✓ جميع فرق التلقيح ترتدي لباساً موحداً

✓ جميع العناصر المشاركة بالحملة مؤهلة ومدربة

الحالات التي تمنع اللقاح

- ارتفاع درجة حرارة الطفل ٣٨,٥ درجة مئوية أو أكثر
- الأمراض المنهكة التي تستدعي دخول المستشفى
- الأمراض المثبطة للمناعة
- الأدوية المثبطة للمناعة
- التحسس لجرعة لقاح سابقة
- مع العلم أن الطفل المعالج بحقنة واحدة من الكورتيزون غير المديد أو المعالج لمدة أقل من ١٥ يوماً لا يعتبر مانعاً للقاح

الحالات التالية لاتمنع اللقاح

- ارتفاع درجة الحرارة البسيط
 - الإسهال
 - السعال والرشح
 - استعمال الصادات الحيوية (أدوية الالتهاب)
- كما يتوفر لقاح الكوفيد للراغبين بتلقي اللقاح وخاصة للأشخاص ذوي الأولوية : كبار السن ، المصابين بالأمراض المزمنة ، والأمراض المناعية ، الحوامل والكادر الطبي.