

التقرير الإحصائي السنوي لدائرة الدراسات الوبائية ومكافحة الأمراض المستجدة

التعريف القياسية للحالات

حالة الهیضة: cholera

تعرف الحالة المشتبهة بأنها حالة إسهال مائي مفاجئ وغزير أدى إلى حدوث تجفاف سريع وشديد، أو وفاة لدى شخص بعمر خمس سنوات فما فوق.

أما الحالة المؤكدة فهي حالة مشتبهة مع إظهار ضمات الهیضة (O139.O1) بالزرع على الأوساط المناسبة. .)

حالة الخناق:

- الحالة المرجحة:

التهاب بلعوم حاد، أو التهاب بلعوم أنفي، أو التهاب حنجرة حاد مع وجود أغشية كاذبة (وهي عبارة عن لطخة أو لطخ من غشاء رمادي ملتصق أو محاط بالتهاب).

- الحالة المؤكدة:

حالة مرجحة مع حالة مثبتة بالفحص الجرثومي لمسحة من الأغشية الكاذبة.

حالة السعال الديكي المشتبهة:

قصة سعال شديد، مع وجود أحد الأعراض التالية: سعال مستمر لأسبوعين أو أكثر، نوب من السعال، سعال متبوع بإقياء.

حالة كزاز الوليد:

حالة كزاز الوليد: (N.T)

قصة مص طبيعي خلال اليومين الأولين من الولادة، ثم يبدأ المرض بين اليوم (28-3) بعد الولادة حيث يصبح الطفل غير قادر على المص والرضاعة ويتبع ذلك تصلب عضلي وتشنجات وقد تحدث اختلاجات، وغالباً ما يتوفى الطفل.

حالة الحصبة: Measles

- الحالة المشتبهة: قصة ترفع حروري مع طفح حطاطي غير حويصلي، مع أحد الأعراض التالية: سعال أو سيلان أنفي أو إحمراز عيني (التهاب ملتحمة)، أو أي حالة يشته بها الطبيب أنها حصبة.
- الحالة المثبتة: حالة مشتبهة مع تأكيد مخبري.

الحصبة الألمانية:

- الحالة المشتبهة: حرارة وطفح حطاطي مع واحد من الأعراض التالية: ضخامة عقد لمفاوية رقبية أو تحت القذال أو خلف الأذن أو التهاب مفصل/ ألم مفصل.
- الحالة المثبتة مخبرياً: حالة مشتبهة مع تأكيد مخبري.
- الحالة المثبتة وبائياً: حالة طفح مع حرارة لدى مريض لم نستطع أخذ عينة دموية منه مرتبطة وبائياً مع حالة مثبتة مخبرياً.

حالة شلل الأطفال المشتبهية:

كل حالة شلل رخو حاد (بدء مفاجئ)، لم يعرف لها سبب، عند طفل بعمر دون الـ (15) سنة من العمر، بما في ذلك حالات تناذر غيلان باريه والتهاب النخاع المعترض وأذية العصب الرضي أو أي حالة يشتبه بها الطبيب على أنها شلل أطفال في أي عمر أي أن الشلل لم يحدث نتيجة حادث ولم يكن موجوداً عند الولادة.

حالة التهاب كبد فيروسي:

- الحالة المشتبهية: حالة شخص مصاب بيرقان مسبق بأعراض عامة (توعك، قهم، غثيان، انزعاج بطني) مع أو بدون حمى.
- الحالة المرجحة: حالة مشتبهية مع فحوص إيجابية لوظائف الكبد وارتفاع خمائر (الأمينوترانسفيراز).
- الحالة المؤكدة: حالة مرجحة مع فحوص مخبرية نوعية إيجابية (كشف المستضد الفيروسي أو ارتفاع أضداد الفيروس).

حالة الحمى التيفية:

- الحالة المشتبهية: حالة مريض يشكو من حمى مع واحد أو أكثر من الأعراض والعلامات التالية صداع، فتور، آلام بطنية، إمساك، سعال جاف، ضخامة طحال، ضخامة كبد، بقع وردية على الجذع.
- الحالات المرجحة: حالة مشتبهية مع عيار أضداد مرتفع (تفاعل فيدال $1/80 >$ أو ارتفاع الأضداد بفحصين متتاليين).
- الحالة المؤكدة: هي حالة مرجحة مع عزل العامل الممرض من الدم أو الأنسجة الأخرى.

حالة الحمى المالطية:

- الحالة المشتبهية: حالة مريض يشكو من حرارة مع واحد أو أكثر من الأعراض والعلامات السريرية: صداع، تعرق غزير (خاصة ليلي)، نوافض، آلام مفصليّة، تعب، أعراض نفسية، ضخامة طحال، ضخامة كبد... أو حالة مرتبطة وبائياً بحالة حيوان (مصّاب أو مشتبه إصابته) أو بمنتجاته.
- الحالة المرجحة: حالة مشتبهية مع عيار أضداد مرتفع (تفاعل رايت $1/160 >$ وارتفاع عيار الأضداد بفحصين متتاليين).
- الحالة المؤكدة: حالة مرجحة مع عزل للعامل الممرض (الدم، نقي العظام، الجهاز الشبكي البطاني...).

حالة داء الكلب:

- الحالة المشتبهية: شخص ظهرت عليه أعراض وعلامات المرض السريرية، بدون معرفة قصته المرضية.
- الحالة المرجحة: حالة مشتبهية مع قصة تماس مع حيوان مشتبه إصابته.
- الحالة المؤكدة: حالة مشتبهية مع تأكيد مخبري.

حالة الملاريا:

- الحالة المشتبهية: كل مريض يشكو من ترفع حروري مع أعراض المرض المذكورة في فقرة تعريف المرض.
- الحالة المؤكدة: حالة مشتبهية مع إظهار الطفيليات في لطاخة دموية بالفحص المجهرى.
- الملاريا الوخيمة: حالة ملاريا مشتبهية تتطلب الدخول للمشفى لتلقي العلاج.

حالة اللاشمانيا:

تعرف الحالة المشتبهية بأنها اندفاع جلدي عقيدي وحيد أو متعدد غير مؤلم ولا حاك يستمر لفترة تزيد عن الثلاثة أسابيع، رغم العلاج بالأدوية اللا نوعية للمرض أما الحالة المؤكدة فهي حالة مشتبهية تم إظهار طفيلي بالفحص المجهرى للطاقات المأخوذة من الآفات.

حالة بلهارسيا:

تعرف حالة البلهارسيا المؤكدة بوجود الأعراض السريرية، عسر التبول، تعدد البيلات، البيلة الدموية، مع ظهور البيوض في البول.

حالة تدرن:

- المشتبه إصابته بالتدرن :
 - التدرن الرئوي :
 - سعال مستمر لمدة (٣) أسابيع أو أكثر دون تحسن بالمعالجة غير النوعية.
 - أو قشع مشوب بالدم أحياناً.
 - أو وجود الأعراض التالية: تعب، فقدان شهية، نقص وزن، تعرق ليلي، حمى، ضيق نفس وألم صدر.
 - التدرن خارج الرئة: حسب العضو المصاب.

حالة: A/H1N12009

١. الحالة المشتبهة للإصابة بفيروس الإنفلونزا الجائحة: (ILI)A (H1N1)
شخص مصاب بحمى مفاجئة أعلى من ٣٨م مترافقة بسعال جاف وألم بلعومي مع واحد أو أكثر من الأعراض التالية: السيلان الأنفي، الصداع، العرواءات، الألم المفصلي وأحياناً الإسهال و/أو الإقياء .
٢. الحالة المشتبهة مع عوامل الخطورة: شخص مصاب بانفلونزا مشتبهة (ILI) مع واحد أو أكثر من عوامل الخطورة التالية :
 - الحمل
 - العمر(دون الخمس سنوات, فوق الخمس وستون سنة)
 - الأمراض المزمنة (أمراض القلب المزمنة, أمراض القصبات والرئة المزمنة, الأمراض الاستقلابية كالسكري, الأمراض الدموية, أمراض نقص المناعة, القصور الكلوي أو الكبدى المزمن..الخ)
 - السمنة
 - الأورام والسرطانات
 - الأدوية المنقصة للمناعة (كالكورتيزون)
٣. الحالة المختلطة:
شخص مصاب بانفلونزا مشتبهة (ILI) مع أو بدون وجود عوامل الخطورة), تطور لديه واحد أو أكثر من الأعراض التالية:
 - صعوبة أو ضيق أو سرعة التنفس
 - زرقة
 - تغييم وعي أو دوام
 - استمرار الحرارة لأكثر من يومين
 - إقياء مستمر مع أو بدون إسهال
 - تجفاف نقص كمية البول
 - هياج أو عدم تجاوب لدى الأطفال
 - ألم في الصدر
 - قشع ملون أو مدمى
٤. حالة تنفسية حادة وخيمة: (SARI)

شخص مصاب بانفلونزا ظهرت عليه منذ البدء واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- عسر تنفس حاد, زيادة سرعة التنفس (> 30) نفس/د للبالغين > 40 نفس/د للأطفال بعمر فوق السنة > 50 نفس/د للأطفال بعمر سنة فما دون.
- علامات تجفاف شديد
- علامات صدمة سريرية
- تغييم وعي أو تخليط ذهني أو هياج لدى البالغين
- هياج أو نعاس وصعوبة في الإيقاظ لدى الأطفال
- تطور سريع للمرض أو استمراره لفترة طويلة (استمرار الحمى بعد يومين من المعالجة بخافضات الحرارة) - صورة الصدر تبين وجود مظاهر غير عادية كارتشاح ثنائي الجانب (ذات رئة)

حالة ايدز

- حالة إصابة بالفيروس (مرحلة سريرية ١-٢ و/أو $CD4 > 350$ خلية/ مل مكعب).
- حالة إصابة متقدمة بالفيروس (مرحلة سريرية ٣-٤ و/أو $CD4 < 350$ خلية/ مل مكعب).
- حالة إيدز (مرحلة سريرية ٤ و/أو $CD4 < 200$ خلية/ مل مكعب).

: (CD4) : +تعداد الخلايا للمقاوية

قائمة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها

الأمراض المستجدة	الشلل الرخو الحاد
التدرن	كزاز الوليد
السعال الديكي	الدفتريا
النكاف	الكوليرا
الحمى التيفية	الملاريا
الحمى المالطية	التهاب السحايا
التهاب الكبد الفيروسي بكافة أشكاله	الحصبة
الكزاز الغير وليدي	الحصبة الألمانية
للايشمانيا الجلدية والحشوية	الكلب
البلهارسيا	الايذز
داء الكيسات المائية	الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا
داء المقوسات	الإسهال المدمى وغير المدمى
	الأمراض المنقولة بالجنس