

تعليمات إعطاء لقاح الكريب (الإنفلونزا)

الإستطباب: يستعمل لقاح الأنفلونزا للوقاية ضد الأنفلونزا في البالغين والأطفال بأعمار أكبر من ٦ أشهر.
اللقاح يوصى به للأشخاص:

-فوق الستين سنة

-الذين يشكون من أمراض نفسية وعائية، أمراض استقلابية (سكري)، التليف الكيسي، أمراض تنفسية مزمنة وقصور الكلية المزمن

-الذين يشكون من نقص مناعي ولادي أو مكتسب

-العاملين بتماس الطيور الداجنة

مضادات الإستطباب:

التحسس لأحد مكونات اللقاح، الفورم الذهبيد، الجنتاميسين سلفات.

احتياطات خاصة عند إعطاء اللقاح:

مثل بقية اللقاحات لا يعطى في الحالات المرضية الحادة المترافقة بترفع حروري شديد.

لا يقي اللقاح من الخمج بعوامل ممرضة أخرى تسبب أعراض وعلامات مشابهة.

الحمل والإرضاع: لا يعطى اللقاح اثناء الحمل إلا في حال الضرورة القصوى ويمكن إعطاؤه أثناء الإرضاع.

التأثيرات الجانبية:

موضوعياً: ألم ، احمرار، توروم

جهازياً: حرارة خفيفة ونادراً آلام عصبية، خدر، اختلاجات، نقص صفائح عابر، ارتكاسات تحسسية بسيطة وخطيرة (كالصدمة التأقية

اضطرابات عصبية نادرة مثل التهاب الدماغ، التهاب الأعصاب، متلازمة غيلان باريه.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

البالغين والأطفال بعمر فوق ٣ سنوات (٠,٥) مل حقناً تحت الجلد أو في العضل مرة واحدة.

الأطفال من عمر ٦ - ٣٦ شهر (٠,٢٥) مل لمرة واحدة.

الأطفال الذين لم يتلقوا سابقاً يجب أن يعطى جرعة ثانية بعد ٤ أسابيع على الأقل.

يحفظ اللقاح في درجة ٢+ م إلى ٨+ م.